


Hautschutz- und Händehygieneplan

WAS	WIE	WOMIT	WORAUS	WANN	WER
Hände 	Hygienische Händedesinfektion - ca. 3 ml Händedesinfektionsmittel in die trockenen Hände einreiben - über die gesamte Einwirkzeit (30 Sek.) hinweg bis zu den Handgelenken kräftig einreiben - Hände über die gesamte Einwirkzeit feucht halten	Cimosept <i>[Einwirkzeit 30 Sek.]</i>	1000 ml Gebinde	- am Arbeitsbeginn /-ende - vor und nach dem Essen, Speisenzubereitung und Speisenverteilung - nach Toilettenbesuch - bei tatsächlicher wie fraglicher Kontamination der Hände mit erregerhaltigen Materialien	Betreuungs- und Reinigungspersonal
	Händewaschen - Hände mit lauwarmen Wasser anfeuchten - Produkt entnehmen und aufschäumen - Hände und Fingerzwischenräume gründlich abspülen und sorgfältig mit Einmalhandtuch abtrocknen	Cimomed	1000 ml Gebinde	- im Falle von sichtbaren Verschmutzungen - nach Toilettenbesuch - nach Naseputzen	Betreuungs- und Reinigungspersonal
	Hautschutz /-pflege - ca. kirschkerngroße Menge auf den Handrücken auftragen - sorgfältig einmassieren	Samolind Sensitive	50 ml Tube	- nach dem Händewaschen - zwischendurch bei Bedarf - am Arbeitsende	Betreuungs- und Reinigungspersonal